

Analysenavn	P—Amylase, pancreastype; kat.k.				
Kortnavn	Amylase pancreastype;P				
Synonym	Glycogenase				
Forkortelse	AMYLP				
IUPAC kode	NPU19653				
Kvantitetsnummer	000113				
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt				
Prøvemateriale	1 mL plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.				
Prøvetagning	Blodet tages i LGRØN 4.5.				
Referenceinterval	≥ 0 dage	- < 1 år	0 - mindre end 8	U/L	
	≥ 1 år	- < 18 år	0 - mindre end 39	U/L	
	≥ 18 år		10 - 65	U/L	
Analyseusikkerhed	4 %				
Unormale værdier	<p>Anvendes ved udredning af mavesmerter, kvalme m.m., idet akut pancreatitis ofte bevirker øget koncentration.</p> <p>Ved kronisk pancreatitis findes ofte anfald uden en amylasekoncentration, der når over øvre referencegrænse.</p> <p>Forhøjede værdier ses hos patienter med ekstrapancreatisk tumor, diabetisk ketoacidose, nedsat nyrefunktion, perionitis, salpingitis og oophoritis, sygdomme, der sekundært giver pancreatitis (eks. cancer pancreatis, alkohol) eller sygdomme i pancreas' naboorganer (levercirrose, galdevejsobstruktion, ulcus).</p> <p>Nedsatte værdier ses hos kroniske pancreatitispatienter mellem evt. også under anfald.</p> <p>Da analysen ikke er helt pancreasoenzym specifik ses også forhøjet resultat i situationer med stærkt forhøjet non-pancreatisk amylase.</p>				

Seneste opdatering 19.04.15