

| | |
|----------------------------------|---|
| Analysenavn | P—Cortisol; stofk. |
| Kortnavn | Kortisol;P |
| Synonym | Compound F, Hydrocortison, CORT |
| Forkortelse | KORT |
| IUPAC - kode | NPU01787 |
| Kvantitetsnummer | 003756 |
| Instruktion for rekvirent | Analyseres dagligt |
| Prøvemateriale | 1 mL plasma Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur. |
| Prøvetagning | Blodet tages i LGRØN 4.5. |
| Referenceinterval | 133-537 nmol/L for prøver taget mellem Kl. 6 og 10 om morgenen 68-327 nmol/L for prøver taget mellem Kl. 16 og 20 om eftermiddagen/aften |
| Analyseusikkerhed | 15 % |
| Unormale værdier | Bestemmelse af P—Cortisol; stofk. i en tilfældigt udtaget serumprøve har pga. de betydelige fysiologiske variationer kun begrænset diagnostisk værdi. Prøver udtaget under standardiserede omstændigheder f.eks. som led i en binyrebark stimulations- eller hæmningstest er diagnostisk vigtige. |
| Bemærkninger | Yderligere oplysninger findes i den laboratoriemedicinske oversigt Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens hos voksne. |

Seneste ændring: 23.06.2016