

Analysenavn	B—Sedimentationsreaktion; længde		
Kortnavn	Sedimentationsreaktion;B		
Synonym	Sænkingsreaktion		
Forkortelse	SR		
IUPAC - kode	NPU03404		
Kvantitetsnummer	001702		
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt		
Prøvemateriale	<p>Prøver til analyse i praksis: 5,2 mL Na-Citrat-stabiliseret blod (SORT 5.2)</p> <p>Prøver til analyse på laboratorium: 1,2 mL Na-Citrat-stabiliseret blod (SORT 1.0)</p> <p>Holdbarheden er 8 timer ved stuetemperatur.</p>		
Prøvetagning	Blodet tages i SORT 5.2 eller SORT 1.0 , som straks vendes 10 gange.		
Referenceinterval	Kvinder	2 - 30	mm
	Mænd	2 - 20	mm
Analyseusikkerhed	-		
Unormale værdier	<p>Forhøjede værdier ses ved forhøjede plasmakoncentrationer af mange proteiner (akut-fase reaktanter, immunglobuliner m.fl.) og ved anæmi. Anvendes ved diagnose og monitorering af infektiose og immunbaserede sygdomme.</p> <p>Anæmi, polyglobuli, sfærocytose, seglcellesygdom, myelomatose m.fl. sygdomme hindrer analysens anvendelse til diagnose og monitorering af inflammatorisk sygdom.</p>		

Seneste opdatering 03.10.16