

Analysenavn	P—Bindeævssygdom-relateret antistof; arb.stofk.
Kortnavn	Bindeævssygdom-relateret-Ab;P
Synonym	ANA
Forkortelse	ANACTD
IUPAC - kode	NPU28402
Kvantitetsnummer	002274
Instruktion for rekvirent	Analyseres dagligt.
Prøvemateriale	1 mL serum Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.
Prøvetagning	Blodet tages i GUL/GEL 3.5 .
Referenceinterval	Mindre end 1,0 arb.enh./L
Analyseusikkerhed	-
Unormale værdier	ANACTD måler IgG autoantistoffer i patientens serum rettet mod cellekerneantigener. Testen er kun nyttig hos en patient, hvor klinikken giver mistanke om bindeævssygdomme. En positiv test (større end eller lig med 1,0 arb.enh./L) støtter en autoimmun diagnose; en negativ test (mindre end 1,0 arb.enh./L) vil med mindst 90% sandsynlighed udelukke autoimmunsygdom (rheumatoid arthritis regnes i denne forbindelse ikke som en autoimmun sygdom). ANACTD korrelerer ikke med sygdomsaktiviteten. Selv efter omhyggelig udvælgelse af patienter til testning for ANACTD finder man aldrig årsagen til ca. 25 % af de positive test.
Bemærkninger	Såfremt ANACTD-screeningen er positiv, udføres udredning på: DNAABIGG SSAABIGG, LUPLaPRABIGG U1RNP CENBABIGG Såfremt disse er negativ, udføres udredning på: SMITHABIGG DNATO1ABIGG HISTABIGG.

Seneste opdatering 22.05.13