

Analysenavn	P—Immunglobulin E; arb.stofk.		
Kortnavn	Immunglobulin E;P		
Synonym	-		
Forkortelse	IGE		
IUPAC - kode	NPU02482		
Kvantitetsnummer	001003		
Instruktion for rekvirent	Analyseres ugentligt Der er begrænset indikation for analysen.		
Prøvemateriale	1 mL serum Holdbarheden er 24 timer ved stuetemperatur.		
Prøvetagning	Blodet tages i GUL/GEL 3.5 .		
Referenceinterval	Navlesnor	mindre end 0,3	x 10 ³ IU/L
	≥ 8 dage - < 6 mdr.	mindre end 15,0	x 10 ³ IU/L
	≥ 6 mdr. - < 2 år	mindre end 50,0	x 10 ³ IU/L
	≥ 2 år - < 6 år	mindre end 100	x 10 ³ IU/L
	≥ 6 år - < 15 år	mindre end 150	x 10 ³ IU/L
	≥ 15 år	mindre end 100	x 10 ³ IU/L
Analyseusikkerhed	14 %		
Unormale værdier	<p>Forhøjede værdier ses ved allergisk sygdom eller sensibilisering. Endvidere ved atopisk dermatitis, svampeinfektioner og parasitinfektioner. Meget sjældent er der fundet et IgE myelom.</p> <p>Ved forhøjede værdier hos den nyfødte øges risikoen for allergiudvikling i barnealderen.</p> <p>De fleste patienter med allergisk sygdom har en koncentration, der ligger i referenceintervallet.</p>		

Seneste opdatering 06.06.18